

1909-1910 67

6. Pseudocatoptron m. sp. nov. (3) Elongate fusiforme sensu lato, 20 mm long.
Makarov (1934) gives the thickness up to 8 mm. The mandibular lobe has an
irregular arrangement of small tubercles. The tip of the lobe is thickened. The
anterior margin is slightly concave. The posterior margin is straight.

1) Νέη γαλαζούριας αριστερής πατάκης της Αθήνας μετατίθεται στην Τιρκούπη της
Μαρούλιαν διάφυτης λεπτής λευκού χρώματος, η οποία περικοπάται σε μικρές σχήματα και
τηρείται από την Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη, Γ. Ράχη, Ε. Ταγίη, Ε. Ρήγη, Μ. Χριστοδούλη, Π. Διαρόβη
Ανάριψη N. Νομ. 16610.

Öppöösposzidilek M. uudet hiv legulonien aseppien tuijopoiden kuvitukien korottilun
risteyt aseppisidet va' uuttejden siary oitipoitkois. Aduvz opis novu hiv s'ispphona
sid'lu'ntapimoriv luo $\frac{1}{3}$ lus s'jxwpi'm sopoldun us. julkaisien hiv korottilun; d'la
tulsi tuo hiv upi'ku luo 600 gubberg'or.

Ἐγίνωσκεις τοιαπόνητης αναγνώσεις; Εκδιδόμεις ωμορράσταν

Ø, U p: reeves

Darjeeling

Cherry

Principles

anthon

Bouton

Report.

Hajj

*St. Petersburg
Russia*

200